レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日(Day)	投与間隔	備考
GC	腎盂がん 尿管上皮がん 膀胱がん	泌尿器	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m² 70mg/m²	30分 2時間	1、8、15 2	28日毎	
GCショート	尿管上皮がん	泌尿器	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m² 70mg/m²	30分 2時間	1、8	21日毎	
GCarbo	尿管上皮がん	泌尿器	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m AUC=4.5	30分 1時間	1、8 1	21日毎	
Avelumab	尿管上皮がん	泌尿器	バベンチオ	10mg/kg	1時間	1	14日毎	
Pembro(3週間隔)	尿管上皮がん	泌尿器	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	
Pembro(6週間隔)	尿管上皮がん	泌尿器	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	
Enfortumab	尿管上皮がん	泌尿器	パドセブ	1.25mg/kg	30分	1、8、15	28日毎	
DTX	前立腺がん	泌尿器	ドセタキセル	55mg/m²	1時間	1	21-28日毎	
カバジタキセル+プレドニン	前立腺がん	泌尿器	ジェブタナ プレドニゾロン	25mg/㎡ 10mg/日	1時間内服	1 1~21	21日毎	
Nivo(2週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	
Nivo(4週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	
ピノルビン膀胱注入	膀胱がん	泌尿器	ピノルビン	30mg/body				
DTX (75mg)	前立腺がん	泌尿器	ドセタキセル	75mg/m²	1時間	1	21日毎	
術後Pembro(3週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	
術後Pembro(6週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	
術後Nivo(2週間隔)	尿路上皮がん	泌尿器	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	
術後Nivo(4週間隔)	尿路上皮がん	泌尿器	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	
Pembro+Axi(3週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	キイトルーダ インライタ	200mg/body 10mg/body	30分 内服	1 1~21	21日毎	
Pembro+Axi(6週間隔)	腎細胞がん	泌尿器	キイトルーダ インライタ	400mg/body 10mg/body	30分 内服	1 1~42	42日毎	