

| レジメン名             | がん種                    | 使用診療科 | 薬品名                       | 1日投与量                             | 投与時間              | 投与日（Day）       | 投与間隔     | 備考                                        |
|-------------------|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------|
| GC                | 腎盂がん<br>尿管上皮がん<br>膀胱がん | 泌尿器   | ゲムシタビン<br>シスプラチン          | 1000mg/㎡<br>70mg/m²               | 30分<br>2時間        | 1、 8、 15<br>2  | 28日 毎    |                                           |
| GCシ ョ ート          | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | ゲムシタビン<br>シスプラチン          | 1000mg/m²<br>70mg/㎡               | 30分<br>2時間        | 1、 8<br>2      | 21日 毎    |                                           |
| GCarbo            | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | ゲムシタビン<br>カルボプラチン         | 1000mg/m<br>AUC=4.5               | 30分<br>1時間        | 1、 8<br>1      | 21日 毎    |                                           |
| Avelumab          | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | バベンチオ                     | 10mg/kg                           | 1時間               | 1              | 14日 毎    |                                           |
| Pembro(3週間隔)      | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | キイトルーダ                    | 200mg/body                        | 30分               | 1              | 21日 毎    |                                           |
| Pembro(6週間隔)      | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | キイトルーダ                    | 400mg/body                        | 30分               | 1              | 42日 毎    |                                           |
| Enfortumab        | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | バドセブ                      | 1.25mg/kg                         | 30分               | 1、 8、 15       | 28日 毎    |                                           |
| Enfortumab+Pembro | 尿管上皮がん                 | 泌尿器   | バドセブ<br>キイトルーダ            | 1.25mg/kg<br>200mg/body           | 30分<br>30分        | 1,8<br>1       | 21日 毎    |                                           |
| DTX               | 前立腺がん                  | 泌尿器   | ドセタキセル                    | 55mg/㎡                            | 1時間               | 1              | 21-28日 毎 |                                           |
| カバジタキセル+プレドニン     | 前立腺がん                  | 泌尿器   | ジェブタナ<br>プレドニゾロン          | 25mg/㎡<br>10mg/日                  | 1時間<br>内服         | 1<br>1～21      | 21日 毎    |                                           |
| Nivo(2週間隔)        | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | オブジーボ                     | 240mg/body                        | 30分               | 1              | 14日 毎    |                                           |
| Nivo(4週間隔)        | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | オブジーボ                     | 480mg/body                        | 30分               | 1              | 28日 毎    |                                           |
| ピノルビン膀胱注入         | 膀胱がん                   | 泌尿器   | ピノルビン                     | 30mg/body                         |                   |                |          |                                           |
| DTX（75mg）         | 前立腺がん                  | 泌尿器   | ドセタキセル                    | 75mg/㎡                            | 1時間               | 1              | 21日 毎    |                                           |
| 術後Pembro(3週間隔)    | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | キイトルーダ                    | 200mg/body                        | 30分               | 1              | 21日 毎    |                                           |
| 術後Pembro(6週間隔)    | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | キイトルーダ                    | 400mg/body                        | 30分               | 1              | 42日 毎    |                                           |
| 術後Nivo(2週間隔)      | 尿路上皮がん                 | 泌尿器   | オブジーボ                     | 240mg/body                        | 30分               | 1              | 14日 毎    |                                           |
| 術後Nivo(4週間隔)      | 尿路上皮がん                 | 泌尿器   | オブジーボ                     | 480mg/body                        | 30分               | 1              | 28日 毎    |                                           |
| Pembro+Axi（3週間隔）  | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | キイトルーダ<br>インライタ           | 200mg/body<br>10mg/day            | 30分<br>内服         | 1<br>1～21      | 21日 毎    |                                           |
| Pembro+Axi（6週間隔）  | 腎細胞がん                  | 泌尿器   | キイトルーダ<br>インライタ           | 400mg/body<br>10mg/day            | 30分<br>内服         | 1<br>1～42      | 42日 毎    |                                           |
| GC+Nivo           | 尿路上皮がん                 | 泌尿器科  | オブジーボ<br>ゲムシタビン<br>シスプラチン | 240mg/body<br>1000mg/㎡<br>70mg/m² | 30分<br>30分<br>2時間 | 1<br>1、 8<br>1 | 21日 毎    | 7コース目以降はNivo単剤（480mg/body）を4週間毎に投与        |
| Nivo+Ipi          | 腎細胞がん                  | 泌尿器科  | オブジーボ<br>ヤーボイ             | 240mg/body<br>1mg/kg              | 30分<br>30分        | 1<br>1         | 21日 毎    | 5コース目以降はNivo単剤(240mg/480mg)を2週間または4週間毎に投与 |
| Nivo+Cabo         | 腎細胞がん                  | 泌尿器科  | オブジーボ<br>カボメティクス          | 240mg or 480mg/body<br>40mg/day   | 30分<br>内服         | 1<br>1～14(28)  | 14/28日 毎 |                                           |
| Ave+Axi           | 腎細胞がん                  | 泌尿器科  | バベンチオ<br>インライタ            | 10mg/kg<br>10mg/day               | 1時間<br>内服         | 1<br>1～14      | 14日 毎    |                                           |
| Len+Pem           | 腎細胞がん                  | 泌尿器科  | キイトルーダ<br>レンビマ            | 200mg or 400mg/body<br>10mg/day   | 30分<br>内服         | 1<br>1～21(42)  | 21/42日 毎 |                                           |