

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	備考
Atezo+BV	肝がん	総合診療科 消化器内科	テセントリク アバスチン	1200mg/body 15mg/kg	60→30分 90→60→30分	1 1	21日毎	
Durva+Treme	肝がん	総合診療科 消化器内科	イミフィンジ イジウド	1500mg/body 300mg/body	1時間 1時間	1 1	28日毎	イジウドは初回のみ投与
Nivo+Ipi（1～4コース目）	肝がん	総合診療科 消化器内科	オプジーボ ヤーボイ	80mg/body 3mg/kg	30分 30分	1 1	21日毎	
Nivo+Ipi（5コース目以降）	肝がん	総合診療科 消化器内科	オプジーボ	480mg/body	30分		1 28日毎	
Durva+GC療法	胆道がん	総合診療科 消化器内科	イミフィンジ ゲムシタビン シスプラチン	1500mg/body 1000mg/m ² 25mg/m ²	1時間 30分 1時間	1 1,8 1,8	21日毎	9コース目以降は1コース28日毎でDurva単剤
CDDP+GEM	胆道がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	30分 1時間	1、8 1、8	21日毎	
GS	胆道がん	消化器内科	ゲムシタビン S-1	1000mg/m ² 60-100mg/body	30分 内服	1、8 1～14	21日毎	
GEM	膵がん・胆道がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1、8、15	28日毎	
GEM+S-1	膵がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタビン S-1	1000mg/m ² 60-100mg/body	30分 内服	1、8 1～14	21日毎	
FOLFIRINOX	膵がん	総合診療科 消化器内科	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 2時間 5-10分 46時間	1 1 1 1 1	14日毎	
GEM+アブラキサン	膵がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタビン アブラキサン	1000mg/m ² 125mg/m ²	30分 30分	1、8、15 1、8、15	28日毎	
nal-IRI+5-FU/LV	膵がん	総合診療科 消化器内科	オニバイド レボホリナート 5-FU	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	90分 2時間 46時間	1 1 1	14日毎	