

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	備考
Atezo+BV	肝がん	総合診療科 消化器内科	テセントリク アバスチン	1200mg/body 15mg/kg	60→30分 90→60→30分	1 1	21日毎	
CDDP+GEM	胆道がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	30分 1時間	1、8 1、8	21日毎	
GS	胆道がん	消化器内科	ゲムシタピン S-1	1000mg/m <sup>2</sup> 60-100mg/body	30分 内服	1、8 1~14	21日毎	
GEM	膵がん・胆道がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	1、8、15	28日毎	
GEM+S-1	膵がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタピン S-1	1000mg/m <sup>2</sup> 60-100mg/body	30分 内服	1、8 1~14	21日毎	
FOLFIRINOX	膵がん	総合診療科 消化器内科	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 2時間 5-10分 46時間	1 1 1 1 1	14日毎	
GEM+アブラキサン	膵がん	総合診療科 消化器内科	ゲムシタピン アブラキサン	1000mg/m <sup>2</sup> 125mg/m <sup>2</sup>	30分 30分	1、8、15 1、8、15	28日毎	
nal-IRI+5-FU/LV	膵がん	総合診療科 消化器内科	オニバイド レボホリナート 5-FU	70mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	90分 2時間 46時間	1 1 1	14日毎	